

# Avertissements<sup>®</sup>

## agricoles Auvergne & Limousin



ISSN : 0763 - 7756

### Grandes cultures

Le 18 Août 1987

n°15

BETTERAVES : Surveiller et intervenir  
C O L Z A : Désherbage

### BETTERAVE SUCRIERE

#### MALADIES

##### ★ Situation

- Cercosporiose : les foyers observés fin juillet progressent dans les situations où les traitements fongicides n'ont pas été réalisés (secteur de JOZE).

- Oïdium : peu de développement pour l'instant car les traitements effectués ont enrayé la progression de la maladie. Foyer important à SAINT-BEAUZIRE (63).

##### ★ Préconisations

*Visiter de toute urgence vos parcelles.*

*Intervenir dès l'observation de symptômes de Cercosporiose, ou d'Oïdium, même si un premier traitement a déjà été effectué en juillet.*

*Bien surveiller l'Oïdium car ces périodes chaudes avec une hygrométrie élevée favorisant l'extension de la maladie.*

*Pour le choix du fongicide, consultez le bulletin n° 13.*

### COLZA

#### DESHERBAGE

Une petite note résume les herbicides utilisables, ainsi que les résultats obtenus en expérimentation avec les associations de produits de pré-semis et post-semis.

© SPV - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

*P. 22*

DESHERBAGE DU COLZA

I - LES HERBICIDES UTILISABLES

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
PRE - SEMIS	diallate	AVADEX	3,5 à 4 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation immédiate après application</li> <li>. Actif uniquement sur graminées</li> <li>. Dose de 4 l si folle-avoine et repousses céréales</li> </ul>
	trifluraline	Nombreuses spécialités dont TREFLAN	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation immédiate après épandage</li> <li>. Actif sur graminées, sauf repousses de céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones : Gaillet et Coquelicot, faible sur Matricaire</li> </ul>
	napropamide	DEVRIOL FL	2,2 à 2,8 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation superficielle dans les 2 jours (sauf si pluies importantes)</li> <li>. Actif sur graminées : sauf folle-avoine et repousses céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones : dont Gaillets, Matricaires</li> <li>. La dose de 2,8 l est une dose maximum à n'utiliser qu'en sol argileux (+ 25 % argile) (risque phytotoxicité sur la culture suivante)</li> </ul>
	nitralin + napropamide	ZULAN FULTON	2,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation superficielle dans les 2 jours</li> <li>. Actif sur graminées : (proche de napropamide)</li> <li>. Actif sur dicotylédones : dont Matricaires</li> </ul>
PRE - SEMIS ou PRE - LEVEE	tébutam	COMODOR	4 à 5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. En pré-semis, incorporation uniquement si sol pierreux</li> <li>. Actif sur graminées : 5 l en pré-semis si risque repousses céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones</li> </ul>
PRE - LEVEE	dimétachlore	TERIDOX	2 à 3 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Risque de phytotoxicité (surtout en terres légères) utiliser 2 l</li> <li>. Actif sur graminées : sauf folle-avoine, repousses céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones : dont Matricaires, Capselles</li> </ul>
	métazachlore	BUTISAN S	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. A n'utiliser qu'en conditions de semis favorables (préparation de sol, date et profondeur de semis). Même dans ces conditions la sélectivité peut être insuffisante.</li> <li>. Utilisation préférable immédiatement après le semis : possible jusqu'à 3 jours après</li> <li>. Très bonne efficacité herbicide</li> <li>. Actif sur graminées sauf repousses céréales et folle-avoine</li> <li>. Actif sur nombreuses dicotylédones : dont Matricaires, Capselles</li> </ul>
POST-LEVEE PRECOCE	métazachlore	BUTISAN S	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>. A utiliser dès le stade "cotylédons étalés - 1ère feuille pointante du colza"</li> <li>. La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles</li> <li>. A la dose de 2,5 l, avant la levée des adventices : Bon sur Capselle, Coquelicot, Mouron Moyen sur Véronique et Pensée</li> </ul>

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
POST - LEVEE	carbétamide	LEGURAME PM	3 kg 5 à 6 kg	. Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation . Application possible sur sol gelé . Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones contre chiendent de <u>Novembre à fin Janvier</u>
	propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg 2 kg 3 kg	. A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation . Application sur sol gelé . Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones contre avoine à chapelet contre chiendent
	propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	. A partir du stade 4 feuille vraies bien développées, 6ème feuille naissante des colzas sains bien implantés. De <u>préférence</u> avant l'hiver . Bonne action sur graminées . <u>Action limitante sur Sanves, Ravenelles</u>
	carbétamide + diméfuron	PRADONE TS	3,5 - 4 kg	. <u>A partir du stade 6 feuilles vraies (B6)</u> des colzas sains et bien implantés. . Application possible sur sol gelé . Action sur dicotylédones : *Efficace sur : Véronique, Matricaire, Stellaire, Coquelicot, Lamier *Irrégulier sur : Pensée, Gaillet *Insuffisant sur : Sanve
	diméfuron + clopyralid	CLERDONE <i>NOUVEAU PRODUIT !</i>	2,5 l	. Sur colza sain bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir du stade 4 feuilles vraies du colza . Action antidicotylédone : * Bonne efficacité sur : Véronique, Coquelicot, Matricaire, Anthémis, Stellaire, Alchemille, Lamier, Gaillet * Moyen sur : Pensée des champs, Capselle * Nul : sur Sanve D'APRES LES RESULTATS DES ESSAIS MENES EN 1986 - 1987, A CONFIRMER.
	alloxydime-sodium	FERVIN + huile	1 kg + 3 l huile 1 kg à 1,25 kg + 3 l huile	. Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec . Action essentiellement sur graminées (sauf Pâturin) contre graminées vivaces
	sethoxydime	FERVINAL	2 l + 3 l huile 3,0 l + 3,0 l huile	. Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées (sauf Pâturin) Schering contre graminées vivaces
	fluazifop-p-butyl	FUSILADE X 2 + AGRAL	0,75 l + 0,1 % vol. AGRAL 1,5 l + AGRAL	. Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Très bonne efficacité sur graminées (0,1 %) contre graminées vivaces

P23



	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
POST - LEVÉE	haloxyfop - éthoxyéthyl	GALLANT	1,0 l	. Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Uniquement à l'automne . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées
			2,0 l	contre graminées vivaces et Pâturin
	quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l + 2,0 l	. Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végéta- tion active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées (sauf Pâturin)
			3,0 l + 8,0 l huile	SIFREN contre les graminées vivaces.

II - ASSOCIATION DE PRODUITS : RESULTATS D'APRÈS L'EXPÉRIMENTATION DE 85 - 86

◆ TREFLAN (2 l) pré-semis puis BUTISAN S (1,5 l) post-semis :

● Spectre d'action

\* Dicotylédones :

Très bon : Capselle  
Bon : Véronique, Coquelicot, Mouron des Oiseaux, Lamier  
Moyen : Pensée

\* Graminées :

Bon : Vulpin des champs, pâturin annuel  
Insuffisant : Repousses de céréales

Programme à conseiller pour flore à dominante dicotylédones.

◆ DEVRINOL FL (2,2 l) pré-semis puis BUTISAN (1,5 l) post-semis :

● Spectre d'action

\* Dicotylédones ) Idem que TREFLAN - BUTISAN S  
et ( mais moyen sur Véronique  
\* Graminées )

Programme à conseiller pour flore à dominante dicotylédones.

◆ COMODOR (3 l) pré-semis puis BUTISAN S (1,5 l) post-semis :

● Spectre d'action

\* Dicotylédones

Très bon : Capselle  
Bon : Coquelicot, Mouron des Oiseaux, Lamier  
Moyen : Pensée, Véronique.

\* Graminées

Bon : Vulpin des champs, pâturin annuel et repousses de céréales

Programme à conseiller pour flore à dominante graminées.

◆ BUTISAN S (1,5 l) post-semis puis BUTISAN S (1,5 l) au stade 2 cotylédons visibles à 1 feuille pointante :

● Spectre d'action

\* Dicotylédones

Très bon : Capselle  
Bon : Coquelicot, Mouron des Oiseaux, Lamier  
Moyen : Véronique, Pensée.

\* Graminées

Bon : Pâturin annuel  
Moyen : Vulpin des champs  
Insuffisant : Repousses de céréales

- Efficacité dans l'ensemble supérieure à une application de BUTISAN S (2,5 l) au stade A-B1 du Colza
- Pour éviter les problèmes de sélectivité, ne pas dépasser le stade "1ère feuille pointante du Colza".
- Programme à privilégier pour la lutte contre les Capselles.